

Jext®

150-300 MICROGRAMMES



Solution injectable en stylo pré-rempli
Adrénaline (sous forme de tartrate)

Document diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Check-list Prescripteur Jext®

Aide à la formation du patient et/ou du personnel soignant


Check-list Prescripteur Jext®

- ✓ Jext® est un stylo pré-rempli (auto-injecteur) délivrant une dose unique d'adrénaline (sous forme de tartrate).
- ✓ Jext® est indiqué dans le traitement d'urgence des réactions allergiques aiguës graves (chocs anaphylactiques) provoquées par des piqûres ou des morsures d'insectes, des aliments, des médicaments ou d'autres allergènes, ainsi que du choc anaphylactique induit par un exercice physique ou idiopathique.
- ✓ La formation des patients et de leur entourage immédiat (parents, personnels soignants, enseignants) est essentielle pour garantir une manipulation correcte et rapide du stylo et ainsi l'administration d'adrénaline dans les situations d'urgence.
- ✓ La spécialité Jext® fait l'objet d'un plan de gestion des risques (PGR) pour réduire les risques d'erreur d'administration.
- ✓ L'objectif de cette check-list, élaborée dans le cadre du PGR, est de vous aider en tant que prescripteur à former le patient et/ou le personnel soignant à l'utilisation correcte, le stockage et l'entretien de Jext®. La check-list peut être utilisée comme un outil d'enseignement général ou pour vous aider lors de vos consultations.
- ✓ Vous devez remettre à vos patients les éléments de réduction du risque élaborés à leur attention (simulateur et brochure d'information patient) et les inciter à visionner les vidéos d'apprentissage de l'utilisation des stylos Jext® diffusées sur le site www.jext.fr.
- ✓ Il est nécessaire que le patient dispose de 2 stylos Jext®¹.

VÉRIFICATION DE LA FENÊTRE DE CONTRÔLE

Avant utilisation

Après utilisation



Déclaration des effets indésirables

- ✓ Tout effet indésirable doit être déclaré au Centre Régional de Pharmacovigilance (CPRV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.
- ✓ Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

Pour plus d'informations, consultez la base de données publique du médicament
<http://base-donnees-publique.medicament.gouv.fr>

Check-list Prescripteur Jext®

Merci de vous assurer qu'en tant que prescripteur vous êtes en mesure de répondre « oui » aux questions ou affirmations suivantes relatives à la prescription, la formation de l'utilisateur et à la conservation de Jext®.

Nom du patient : _____

» Prescription

Le patient pèse-t-il entre 15 kg et 30 kg ?	» Prescrire Jext® 150 microgrammes
Le patient pèse-t-il plus de 30 kg ?	» Prescrire Jext® 300 microgrammes
J'ai prescrit 2 auto-injecteurs Jext® au patient	
J'ai recommandé au patient d'avoir 2 auto-injecteurs Jext® avec lui en permanence, pour le cas où une seule injection ne suffirait pas à améliorer les symptômes lors d'un choc anaphylactique	

» Mode d'emploi

Le patient connaît les symptômes d'un choc anaphylactique et je lui ai expliqué dans quelles situations Jext® doit être utilisé	
J'ai expliqué au patient, à l'aide du mode d'emploi présenté au verso de ce document, comment utiliser correctement l'auto-injecteur Jext®	
J'ai indiqué au patient de composer le 15 ou le 112 immédiatement après avoir utilisé Jext® et de demander l'intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie » et ce, même si les symptômes semblent s'améliorer	
J'ai indiqué au patient que si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent 5 à 15 minutes après la première injection de Jext®, il devra procéder à l'administration d'une nouvelle dose en utilisant un 2 ^e auto-injecteur Jext®	
J'ai remis au patient un simulateur Jext® (stylo de démonstration sans adrénaline ni aiguille) afin de s'entraîner et de savoir agir lors d'une situation allergique critique	
J'ai demandé au patient de ne pas transporter ou stocker le simulateur avec les auto-injecteurs Jext®	
J'ai remis au patient la brochure d'information patient expliquant comment utiliser l'auto-injecteur Jext® et réduire les risques d'erreur d'administration	
J'ai incité le patient à visionner la vidéo d'utilisation de l'auto-injecteur Jext® diffusée sur le site internet www.jext.fr	

» Conservation

J'ai indiqué au patient de conserver les auto-injecteurs Jext® à une température ne dépassant pas 25°C et de ne pas les mettre au congélateur	
J'ai indiqué au patient de vérifier régulièrement le contenu de la cartouche en verre des auto-injecteurs Jext® par la fenêtre de contrôle au niveau de l'étiquette pour s'assurer que le liquide est toujours clair et incolore, et de remplacer les auto-injecteurs Jext® si la solution est colorée ou contient un précipité (des particules solides)	
J'ai indiqué au patient de vérifier régulièrement la date de péremption de ses auto-injecteurs Jext® afin de les remplacer si nécessaire	
J'ai recommandé au patient d'enregistrer un rappel de la date de péremption de ses stylos auto-injecteurs Jext® dans son téléphone	

Signature du prescripteur : _____ Date : _____

Jext® : Mode d'emploi

Chaque auto-injecteur Jext® est à usage unique.

1



Vérifiez à travers la fenêtre de contrôle que la solution est limpide et incolore.

Tenez le stylo injecteur Jext® dans votre main dominante (celle que vous utilisez pour écrire) avec votre pouce le plus près possible du bouchon jaune.

2



Retirez le bouchon jaune avec l'autre main.

3



Placez l'extrémité noire du stylo injecteur contre la face extérieure de votre cuisse, tenez l'injecteur à angle droit de la cuisse (environ 90°).

4



Pressez fermement l'extrémité noire contre l'extérieur de votre cuisse jusqu'à ce que vous entendiez le déclic confirmant le début de l'injection, maintenez-le en position. Tenez fermement l'injecteur en place contre la cuisse pendant 10 secondes (comptez lentement jusqu'à 10) puis retirez. L'extrémité noire s'étire automatiquement pour recouvrir l'aiguille.

5



Massez la zone d'injection pendant 10 secondes. Recherchez immédiatement une aide médicale. Composez le 15 (ou le numéro international 112) et demandez l'intervention du SAMU en précisant « anaphylaxie ».

En attendant l'ambulance, vous devez rester allongé avec les pieds surélevés à moins que cela vous empêche de respirer ; dans ce cas, vous devez vous asseoir. Demandez à quelqu'un de rester à vos côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, dans le cas où vous vous sentiriez mal à nouveau.

Si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent dans les 5 à 15 minutes qui suivent la 1^{re} injection, vous ou la personne vous accompagnant, devez procéder à une seconde injection avec un autre stylo Jext®.

C'est pourquoi vous devez avoir en permanence 2 stylos Jext® sur vous